

Popis bezreceptnih lijekova s jednom djelatnom tvari odobrenih u Republici Hrvatskoj (bez biljnih lijekova)

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
1	A01AB12	hexetidinum	za usta i ždrijelo	Ø	200 mg	uništavanje mikroorganizama u usnoj šupljini i ždrijelu, ublažavanje simptoma kod lakših do umjereno teških upala usne šupljine i ždrijela (afte, upale desni, parodontitisa s krvarenjem desni, upale krajnika, upale ždrijela, upale jezika, gljivičnih bolesti usne šupljine), sprječavanje rasta mikroorganizama u zubnom plaku i na sluznici usne šupljine te prije i nakon zubarskih zahvata, održavanje higijene usne šupljine kod teških sustavnih bolesti te za uklanjanje neugodnog zadaha iz usta	Ø	odrasli i djeca starija od 2 godine	primjena kroz dulje vrijeme samo po savjetu liječnika ili zubara
2	A01AD02	benzydaminum	za usta i ždrijelo	otopina za grgljanje 20,1 mg; pastile 2,68 mg; sprej odasli i djeca starija od 12 godina 1,824 mg; djeca od 6-12 godina 0,912 mg; djeca mlađa od 6 godina 4x 0,228 mg/4 kg tjelesne težine	otopina za grgljanje 321,6 mg; pastile 53,6 mg; sprej 40,2 mg	liječenje simptoma bolnih upalnih stanja i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu (npr. upala desni, upala sluznice usne šupljine, upala sluznice ždrijela) i kao nadopuna uobičajenog stomatološkog liječenja kao i nakon vađenja zuba.	otopina za grgljanje 60,3 mg/pastile 8,04 mg; sprej odasli i djeca starija od 12 godina 10,944 mg; djeca od 6-12 godina 5,472 mg; djeca mlađa od 6 godina 24x 0,228 mg/4 kg tjelesne težine	otopina za grgljanje sve dobne skupine osim male djece; pastile odasli i djeca iznad 6 godina; sprej sve dobne skupine	7 dana
3	A02AD04	hydrotalcitum	kroz usta	1000 mg	10 000 mg	simptomatsko liječenje poremećaja kod kojih je potrebno neutralizirati kiselost želuca: vrijed želuca ili dvanaesnika (želučani ulkus i duodenalni ulkus) te žgaravica i želučani poremećaji zbog kiseline	6000 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	2 tjedna
4	A02BA02	ranitidinum	kroz usta	150 mg	1500 mg	sprječavanje i uklanjanje simptoma žgaravice i povećane kiselosti u želucu te loše probave, smanjenje prekomjernog izlučivanja želučane kiseline	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	14 dana

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
5	A02BC01	omeprazolum	kroz usta	20 mg	140 mg	sprječava prekomjerno lučenje želučane kiseline kod učestalih žgaravica i ostalih dispeptičkih tegoba (bol u trbuhi, osjećaj punoće, pritisak, nadutost, podriđivanje, vjetrovi)	20 mg	odrasli-starji od 18 godina	2 tjedna
6	A02BC02	pantoprazolum	kroz usta	20 mg	280 mg	za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (npr. žgaravica, dizanje kiseline u usta) u odraslih	20 mg	odrasli-starji od 18 godina	4 tjedna
7	A03AD02	drotaverinum	kroz usta	80 mg	2400 mg	spazam glatkih mišića u bolestima žučnog sustava: žučni kamenac, upala žučnog mjehura, spazam glatkih mišića u bolestima mokraćnog sustava: bubrežni kamenac, kamenac u mokraćovodu, upale mokraćnog sustava (pijelitis, cistitis), grčevi mokraćnog mjehura; kao pomoćna terapija: u slučaju spazma glatkih mišića probavnog sustava: čir na želucu i dvanaesniku, upala želučane sluznice (gastritis), želučani grčevi, upala debelog crijeva (kolitis), preosjetljivost i iritabilnost debelog crijeva udruženi s zatvorom konstipacijom) i nadutošću (meteorizmom), u određenim tipovima glavobolja (tenzijski tip), u ginekološkim bolestima: bolna menstruacija	odrasli: 240 mg; djeca iznad 12 godina: 160 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	nekoliko dana
8	A03AX	dimeticonum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 16 godina 160 mg; djeca od 6-14 godina 80 mg	1600 mg	uklanjanje simptoma želučano-crijevnih tegoba izazvanih prekomjernim nakupljanjem plinova npr. meteorizma, nadutost, aerofagija, Roemheldov sindrom; pomoćna mjera prije dijagnostičkih pretraga u području trbuha; protiv pojačanog stvaranja plinova nakon kirurških zahvata	320 mg-želučano crijevne tegobe; 400 mg-prije dijagnostičkih pretraga	odrasli i djeca starija od 6 godina	po potrebi i dulje vrijeme

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
9	A03AX	simeticonum	kroz usta	2,075 g - priprema za dijagnostičke pretrage; 80 mg - simptomatsko liječenje	4000 mg	uklanjanje simptoma želučano-crijevnih tegoba izazvanih prekomjernim nakupljanjem plinova (meteorizam, osjećaj prepunih crijeva), pomoćna mjera prije dijagnostičkih pretraga u području trbuha (rendgen, ultrazvuk, gastroduodenoskopije), protiv pojačanog stvaranja plinova nakon kirurških zahvata, protiv trovanja sredstvima za pranje	2,075 g	suspenzija sve dobne skupine, kapsule odrasli i djeca starija od 6 godina	nije ograničeno
10	A06AB02	bisacodylum	kroz usta	10 mg	150 mg	kronična začepljenja, priprema za dijagnostičke postupke, u preoperativnim i postoperativnim postupcima	10 mg	čepići: odrasli i djeca iznad 10 godina; tablete: odrasli i djeca iznad 4 godine	čepići 3 dana; tablete 14 dana
11	A06AB08	sodium picosulfate	kroz usta	5 mg	225 mg	kratkotrajno liječenje kroničnog zatvora	10 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	moguća dugotrajna primjena svaki drugi dan
12	A06AD11	lactulosum liquidum	kroz usta	odrasli i djeca iznad 14 godina: 30,015 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 6,67 g; dojenčad: 3,335 g; hepatička encefalopatija: 33,35 g	200,1 g	česti ili povremeni zatvor (opstipacija) kod: bolnog pražnjenja stolice, za uspostavu normalanog rada crijeva, nakon operacije, kod bolesnika koji dugotrajno moraju ležati u krevetu; sprječavanje opstipacije; opstipacija uzrokovana određenim lijekovima, hepatičke (portalne) encefalopatije (poremećaj jetrene funkcije koji dovodi do nakupljanja toksina u krvi)	odrasli: 30,015 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 6,67 g; dojenčad: 3,335 g; hepatička encefalopatija: 100,05 g	sve dobne skupine uključujući dojenčad	3 dana
13	A06AX01	glycerolum	rekthalno	odrasli 2,25 g; djeca starija od 2 godine: 1,375 g	22,5 g	kod povremene opstipacije i konstipacije te kada nije moguća primjena oralnih laksativa	odrasli 4,5 g; djeca starija od 2 godine: 1,375 g	odrasli i djeca starija od 2 godine	7 dana
14	A07BA01	carbo activatus	kroz usta	3 g akutno trovanje; 1,05 g proljev i napuhnutost; 0,6 g djeca starija od 3 godine	19,25 g	akutno trovanje unesenim lijekom ili otrovom (analgetici, antipiretici, sedativi, hipnotici, antiepileptici, triciklički antidepresivi, kardiotonični glikozidi, sulfonamidi, kinin, teofillin, nikotin); trovanje hranom; proljev; napuhnutost	18 g akutno trovanje; 4,2 g proljev i napuhnutost; 1,2 g djeca starija od 3 godine	odrasli i djeca starija od 3 godine	napuhnutost 7 dana; proljev 4 dana

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
15	A07FA49	polirezistentne spore Bacillus clausii	kroz usta	kapsule: odrasli 6 000 000 000, djeca 4 000 000 000; oralna suspenzija: odrasli 6 000 000 000, djeca 4 000 000 000, dojenčad 4 000 000 000	40 milijardi polirezistentnih spora Bacillus clausii	liječenje i sprječavanje promjena crijevne bakterijske flore	kapsule: odrasli 6 000 000 000, djeca 4 000 000 000; oralna suspenzija: odrasli 6 000 000 000, djeca 4 000 000 000, dojenčad 4 000 000 000	kapsule odrasli i djeca; oralna suspenzija sve dobne skupine uključujući dojenčad	---
16	A08AB01	orlistatum	kroz usta	60 mg	5040 mg	za smanjenje tjelesne težine (ITM 28 i veći)	180 mg	odrasli-starji od 18 godina	12 tjedana mjeseci max. 6
17	A11DA01	thiaminum	kroz usta	100 mg	1000 mg	za sprječavanje nedostatka vitamina B1 kod povećane potrebe (trudnoća, dojenje, dugotrajna povećana tjelesna aktivnost, stres, pojačani rad štitnjače, dugotrajne zarazne bolesti, jetrene ili crijevne bolesti, kronična hemodializa, prehrana pretežno ugljikohidratima, alkoholizam), liječenje beri-beri i wernickeova encefalopatija, bolesti nastale kao posljedica urođenih poremećaja metabolizma	300 mg	odrasli	---
18	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	odrasli skorbut 1 g, prevencija hipovitaminoze 500 mg; djeca 100 mg	20 g	prevencija i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu	odrasli skorbut 2 g, prevencija hipovitaminoze 500 mg; djeca skorbut 300 mg, prevencija hipovitaminoze 100 mg	odrasli i djeca	nekoliko tjedana

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
19	B01AC06	acidum acetylsalicylicum	kroz usta	300 mg	3000 mg	smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris, smanjenje rizika od dodatnog začepljenja srčanih arterija nakon srčanog udara, sprječavanje ponovne pojave tromboze nakon operacije krvnih žila, npr. ugradnje srčane prenosnice, sekundarna prevencija prolaznih smetnji moždane cirkulacije i moždanog udara, liječenje akutnog srčanog udara, smanjene rizika od kardiovaskularnih incidenata (koji zahvaćaju srce i krvožilni sustav), kao što su angina pektoris ili srčani udar u bolesnika sa šećernom bolešću i visokim kardiovaskularnim rizikom	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	---
20	C05BA03	heparinum natricum	za kožu	Ø	100 000 IU	upale površinskih vena, tromboflebitis i pratećih simptoma proširenih vena	Ø	odrasli i djeca starija od 2 godine	14 dana
21	C05CA04	troxerutinum	kroz usta	300 mg	15 000 mg	simptomatsko liječenje oslabljene venske i limfne cirkulacije te za ublažavanje simptoma povezanih sa hemoroidima (oticanje, svrbež, krvarenje, curenje)	1200 mg	odrasli	7-10 dana
22	D01AC01	clotrimazolum	za kožu	Ø	300 mg	gljivične infekcije stopala i ruku, kože na trupu, udovima, kožnim pregibima i u preponama, gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor, infekcije vanjskih spolnih organa gljivicama iz roda Candida u žena i muškaraca, bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma	Ø	odrasli	4 + 2 tjedna
23	D01AC08	ketoconazolum	na vlasiste	Ø	100 ml šampona	za liječenje i sprječavanje peruti i nekih gljivičnih bolesti kože (Pityriasis versicolor i seboroični dermatitis)	Ø	odrasli i djeca starija od 12 godina	4 tjedna
24	D02AE01	ureum	za kožu	Ø	6 g	za liječenje suhe kože kod atopijskog dermatitisa, kod starenja kože, za liječenje ihtioze	Ø	odrasli	po preporuci liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
25	D03AX03	dexpanthenolum	za kožu	Ø	1250 mg	lokalno, kod mehaničkih oštećenja kože - ogrebotina, hiperkeratoze, manjih oštećenja, nakon kirurških zahvata i opeklina, smanjuje svrbež i poboljšava zarastanje blažih dermatoza, u djece primjena kod ogrebotina i blažih kožnih nadražaja uzrokovanih suncem, ultraljubičastim ili rendgenskim zračenjem	Ø 2-3 x dnevno, po potrebi češće	odrasli	---
26	D04AA09	chloropyraminum	za kožu	Ø	200 mg	lokalni anestetik kod uboda insekata i svrbeža	Ø	odrasli	3 dana
27	D04AA13	dimetindenum	za kožu	Ø	30 mg	ublažavanje svrbeža povezanog sa osipom, urtikrijom, ubodima insekata, sunčanim i površinskim opekotinama	Ø	odrasli	---
28	D06AX08	tyrothricinum	za kožu	Ø	5 mg	lokalni antibiotik za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana	Ø	odrasli	7 dana nakon povlačenja simptoma, za slučaj pogoršanja simptoma ili izostanka pozitivnog odgovora tijekom prvih 7 dana-obratiti se liječniku
29	D06BB03	aciclovirum	na koži	Ø	100 mg	za liječenje "groznice" (herpes labialis), infekcije kože uzrokovane Herpes simplex virusom	Ø	odrasli i djeca	min 5 dana max 10 dana
30	D08AG02	povidonum iodinatum	za kožu	Ø	100 g	dezinfekcija i sprječavanje infekcija na koži, terapijska obrada rana, terapijsko i profilaktičko ispiranje mjeđuhra crijeva, pleuralno, peritonealno i vaginalno ispiranje	Ø	sve dobne skupine osim novorođenčadi	dok postoji infekcija ili opasnost od infekcije
31	D11AB58	paraffinum liquidum	za kupanje	Ø	96 g	emoliens i protektiv kod suhih i ljudskajućih dermatoza: psorijaza i atopijski dermatitis (endogeni ekzem)	Ø	odrasli i djeca	4 tjedna
32	D11AX01	minoxidilum	za kožu	20 mg	1200 mg	liječenje androgene čelavosti u muškaraca i žene u dobi između 18 i 65 godina	40 mg	odrasli muškarci i žene od 18 do 65 godina	4 mjeseca do 1 godine
33	D11AX01	minoxidilum	za kožu	50 mg	3000 mg	liječenje androgene čelavosti u muškaraca u dobi između 18 i 65 godina	100 mg	odrasli muškarci od 18 do 65 godina	2 mjeseca do 1 godine
34	G01AD01	acidum (S)-lacticum, natrii lactatis solutio	u rodnici	207 mg	280 mg	lakši i srednje teški kronični ili recidivirajući vaginitis (bakterijske vaginoze i nespecifični vaginitis)	207 mg	odrasli	5-7 dana

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
35	G01AF02	clotrimazolum	za kožu; u rodnici	za kožu: Ø; u rodnici: 500mg	za kožu: 400 mg; u rodnici: 600 mg	za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica Candida), za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit Trichomonas vaginalis u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik, za liječenje infekcija koje sejavljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primjenjeni lijek (tzv. superinfekcije) liječenje infekcija stidnih usana i predjela okonjih (kandidni vulvitis), liječenje upale glaviča i kožice muškog uda (kandidni balanitis)	za kožu: Ø; u rodnici: 500mg	za kožu: odrasli i djeca starija od 12 godina; u rodnici: žene i devojke starije od 12 godina	7 dana
36	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 12 godina: 400 mg; djeca 10-12 godina 300 mg; djeca 7-9 godina 200 mg; djeca 4-6 godina 150 mg; djeca 1-3 godine 100 mg; dojenčad 6 mjeseci do 1 godine 50 mg; novorođenčad i dojenčad od 3 do 6 mjeseci 50 mg	8000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature uslijed obične prehlade, gripe i drugih upalnih bolesti, ublažavanje blagih do srednje jakih bolova i tegobe uslijed obične prehlade, gripe i upalnih bolesti (primjerice grlobojla, uhobojla), glavobolja, bol uslijed ozljede (iščašenja, uganuća) zubobolja, bol pri nicanju zubi, menstruacijska bol i bol kod predmenstruacijskog sindroma (prijava dismenoreja), bolovi reumatskog podrijetla (lumbago, artritis i drugo), bolova koji potječu od živaca (neuralgija)	odrasli i djeca starija od 12 godina: 1200 mg; djeca 10-12 godina 900 mg; djeca 7-9 godina 600 mg; djeca 4-6 godina 450 mg; djeca 1-3 godine 300 mg; dojenčad 6 mjeseci do 1 godine 200 mg; novorođenčad i dojenčad od 3 do 6 mjeseci 150 mg	odrasli, djeca svih dobnih skupina i dojenčad starija od 3 mjeseca	odrasli i djeca starija od 12 godina: za ublažavanje boli 10 dana, za snižavanje tjelesne temperature 3 dana, dojenčad od 3 do 6 mjeseci: 1 dan; dojenčad starija od 6 mjeseci: 3 dana.
37	M02AA07	piroxicamum	za kožu	Ø	500 mg	ublažavanje bolova, upale i otekline zglobova pri reumatskim bolestima, kod zglobova osjetljivim na dodir, bolova i otekline nakon uganuća, nagnjećenja, istegnuća, boli u leđima	Ø	odrasli i djeca starija od 12 godina, kod starijih od 65 godina primijeniti najnižu učinkovitu dozu kroz najkratće moguće vrijeme	akutna stanja 7 dana, kronična stanja 4 tjedna

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
38	M02AA13	ibuprofenum	za kožu	Ø	5000 mg	analgetsko i protuupalno djelovanje za liječenje reumatskih bolova, bolova u mišićima, bolova u leđima, bolova i otekline izazvanih iščašenjem, istegnućem te kod neuralgija	Ø	odrasli i djeca starija od 12 godina	2 tjedna
39	M02AA15	diclofenacum	za kožu	Ø	1000 mg	olakšanje боли i smanjenje upale i otekline kod velikog broja bolnih stanja koji utječu na zglobove i mišice, teticu i ligamente: nagnjećenja, uganuća i iščašenja, izvanzglobni reumatizam, degenerativni reumatizam	Ø	odrasli i djeca starija od 12 godina	14 dana
40	N02BA01	acidum acetylsalicylicum	kroz usta	300 mg za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris, za smanjenje rizika od moždanog udara u bolesnika s tranzitornim ishemijskim atacima, sekundarna prevencija srčanog udara, sekundarna prevencija moždanog udara, prevencija tromboembolije, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s jednim ili više rizičnih faktora za nastanak kardiovaskularnih bolesti; 1000 mg zaublažavanje bolova, snižavanje povišene tjelesne temperature, protuupalno djelovanje	10000 mg	uklanjanje srednje jakе боли (glavobolja, zubobolja, bol zbog upale živca, ishijalgija, reumska bol, mišićna bol, bol nakon operacije, povrede ili opeklina, menstrualna bol), za snižavanje povišene tjelesne temperature, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris, za smanjenje rizika od moždanog udara u bolesnika s tranzitornim ishemijskim atacima, sekundarna prevencija srčanog udara, sekundarna prevencija moždanog udara, prevencija tromboembolije, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s jednim ili više rizičnih faktora za nastanak kardiovaskularnih bolesti	300 mg za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris, za smanjenje rizika od moždanog udara u bolesnika s tranzitornim ishemijskim atacima, sekundarna prevencija srčanog udara, sekundarna prevencija moždanog udara, prevencija tromboembolije, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s jednim ili više rizičnih faktora za nastanak kardiovaskularnih bolesti	odrasli i djeca starija od 16 godina	3 dana kod ublažavanja bolova, snižavanja povišene tjelesne temperature, protuupalnog djelovanja, duži period svaki ili svaki drugi dan kod smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
41	N02BE01	paracetamolum	kroz usta; rektalno	oralni oblici: novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 60 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 120 mg, djeca 1-6 godina (teška 10-20 kg) 240 mg, djeca 6-12 godina (teška 20-40 kg) 480 mg; odrasli i djeca teža od 50 kg: 1000 mg; čepići 15 mg/kg	tablete: 10 g; čepići 2,5 g	uklanjanje umjereno do srednje teških bolova različitog uzroka (glavobolja uključujući migrensku i tenzijsku, zubobolja, bol nakon ozljeda, medicinskih ili stomatoloških zahvata, bolne menstruacije, križobolja, bol uslijed artritsa), bolovi u mišićima i zglobovima, reumatski bolovi, bolovi uslijed nicanja zubi, grlobojla, snižavanje povišene tjelesne temperature	oralni oblici: novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 240 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 480 mg; djeca 1-6 godina (teška 10-20 kg) 960 mg; djeca 6-12 godina 40-50 kg: 2000 mg; odrasli i djeca teža od 50 kg: 4000 mg; čepići 60 mg/kg/dan	oralno: odrasli, djeca, dojenčad i novorođenčad; rektalno: djeca od 1 mjeseca (tjelesne težine veće od 4 kg) do 12 godina (tjelesne težine veće od 25 kg)	protiv temperature 3 dana, protiv bolova odrasli 10 dana, a djeca 5 dana
42	N07BA01	nicotini resinas	sublingvalno, kroz kožu	sublingvalno 4 mg; kroz kožu 25 mg	sublingvalno: 420 mg; kroz kožu: 798 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	sublingvalno: 96 mg; kroz kožu: 60 mg	odrasli, stariji od 12 godina	min 3 mjeseca, max 12 mjeseci
43	R01AA05	oxymetazolinum	za nos	0,1 mg (kapi) ili 0,08 mg (sprej) odrasli i djeca starija od 6 godina; 0,4 mg (kapi) ili 0,05 mg (sprej) djeca od 2 do 7 godina	5 mg	upala sluznice nosa uzrokovana prehladom (akutni rinitis), peludna hunjavica (alergijski rinitis) i napadaj neinfektivnog vazomotornog rinitisa, za poboljšanje otjecanja sekreta kod upala nazalnih i paranasalnih sinusu te upala slušne cijevi povezano s rinitisom, za smanjenje oticanja sluznice u dijagnostičke svrhe	0,3 mg odrasli i djeca starija od 6 godina; 0,15 mg djeca od 2 do 7 godina	odrasli i djeca starija od 2 godina	7 dana
44	R01AA07	xylometazolinum	za nos	0,2 mg odrasli i djeca starija od 6 godina; 0,1 mg djeca od 2-6 godina	10 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	0,6 mg odrasli i djeca starija od 6 godina; 0,3 mg djeca od 2-6 godina	odrasli i djeca starija od 2 godine	5 dana
45	R01AA08	naphazolinum	za nos	0,4 mg	10 mg	simptomatsko liječenje svih vrsta upale nosne sluznice, sinusitisa, upale srednjeg uha, zaustavljanje krvarenja iz nosa i priprema za pregledne ili kirurške zahvate u nosnoj šupljini (dodatak topikalnim anesteticima)	2,4 mg odrasli; 0,8 mg djeca 5-14 god.; 0,4 mg djeca 3-5 god.	odrasli i djeca starija od 3 godine	5 dana

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
46	R02AA06	cetylpyridinium	za usta i ždrijelo	1,2 mg	21,6 mg	blage infekcije usne šupljine i ždrijela (faringitis, laringitis, početak angine), upala desni i sluznice usne šupljine (stomatitis, gingivitis), simptomi prehlade i gripe (bol, suhoća i grebanje u ždrijelu, promuklost i loš zadar)	9,6 mg	odrasli i djeca starija od 4 godine	3 dana
47	R02AA15	povidonum iodinatum	za usta i ždrijelo	Ø	1 g	sprječavanje i lječenje infekcija usta i ždrijela: bakterijskih, virusnih i gljivičnih (gingivitis, stomatitis, afte, površinski abscesi ili abscesi herpesa), sprječavanje infekcija prije ili nakon operacije zuba, uklanjanje neugodnog mirisa iz usta	Ø	odrasli i djeca starija od 7 godina	---
48	R05CB01	acetylcysteignum	kroz usta	200 mg odrasli i djeca starija od 14 godina; 200 mg djeca od 6 - 14 godina; 100 mg djeca od 2 - 6 godina	24 000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	600 mg odrasli i djeca starija od 14 godina; 600 mg djeca od 6 - 14 godina; 400 mg djeca od 2 - 6 godina	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana
49	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	16 mg	320 mg	sekretolitik (razrjeđuje sluz) i sekretomotorik (pospješuje izlučivanje sluzi iz dišnih organa) u akutnim i kroničnim bolestima bronha i pluća s abnormalnim izlučivanjem i prijenosom sluzi	48 mg	odrasli i djeca iznad 1 godine	14 dana
50	R05CB06	ambroxolum	za grlo i ždrijelo; kroz usta	sprej: 10 mg; tablete, kapsule i pastile: odrasli 120 mg djeca starija od 12 godina 90 mg	sprej 1250 mg; tablete, kapsule i pastile: 750 mg	liječenje akutnih i kroničnih bolesti pluća i dišnih puteva u kojima dolazi do poremećaja transporta i/ili eliminacije sluzavog sekreta iz dišnih puteva i dušnika.	odrasli 120 mg djeca starija od 12 godina 90 mg	sprej: odrasli i djeca iznad 12 godina; tablete i pastile; odrasli i djeca iznad 6 godina; kapsule odrasli i djeca starija od 12 godina	sprej: 7 - 14 dana; tablete, kapsule i pastile 4-5 dana
51	R05DA09	dextromethorphanum	kroz usta	15 mg odrasli i djeca starija od 12 godina; 10 mg djeca u dobi od 6-12 godina	450 mg	za kratkotrajno liječenje suhog, neproduktivnog kašla uzrokovanih prehladom, gripom, febrilnim katarom ili inhalacijom nadražajnih tvari	60 mg odrasli i djeca starija od 12 godina; 40 mg djeca u dobi od 6-12 godina	odrasli i djeca iznad 6 godina	odrasli i djeca starija od 12 godina 7 dana; djeca u dobi od 6-12 godina 5 dana
52	R05DB13	butamiratum	kroz usta	24 mg odrasli; 12 mg djeca starija od 9 godina ; 12 mg djeca od 6 - 9 godina; 8 mg djeca od 3 - 6 godina; 4 mg djeca od 1 - 3 godine	160 mg	liječenje nadražajnog neproduktivnog kašla te za prevenciju i smirivanje kašla prije i nakon bronhoskopije i kirurških zahvata	72 mg odrasli; 48 mg djeca starija od 9 godina ; 36 mg djeca od 6 - 9 godina; 24 mg djeca od 3 - 6 godina; 12 mg djeca od 1 - 3 godine	odrasli i djeca starija od 1 godine	3 dana kod djece mlađe od 12 god. 5 dana kod odraslih i djeca iznad 12 god.

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Količina djelatne tvari u najvećoj odobrenoj veličini pakovanja	Indikacije (kumulativno)	Maksimalna dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene
53	R06AA02	dimenhydrinatum	kroz usta	50 mg	500 mg	prevencija i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja te drugog uzorka (osim u slučajevima uzimanja antineoplastičnih lijekova)	400 mg	odrasli i djeca starija od 5 godina	---
54	R06AE07	cetirizinum	kroz usta	10 mg	100 mg	simptomatsko liječenje cjelogodišnjeg rinitisa (hunjavice), sezonskog alergijskog rinitisa (alergijske hunjavice) i kronične koprivnjače (idiopatske urticarije)	10 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	7-10 dana
55	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	140 mg	alergijski rinitis sezonski (peludna groznicu) ili tijekom cijele godine, alergijske reakcije kože	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	2 tjedna
56	R06AX26	fexofenadinum	kroz usta	120 mg	1200 mg	za ublažavanje simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju	120 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	5 dana
57	S01GA01	naphazolinum	kapi za oko, otopina	0,05 mg	5 mg	ublažavanje simptoma nadraženosti oka uzrokovanih prašinom, vjetrom, smogom, plivanjem, dugotrajnim gledanjem televizije, prehladom i slično	0,25 mg	odrasli i djeca starija od 7 godina	4 dana
58	S01GA02	tetryzolinum	u oko	0,05 mg	7,5 mg	simpatomimetik kod nadražaja i crvenila oka	0,15 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	48 sati
59	S01GX08	ketotifenum	u oko	0,025	2 mg	liječenje očnih tegoba izazvanih peludnom alergijom, poput crvenila, svrbeža i pojačanog suzenja	0,05 mg	odrasli i djeca starija od 3 godine	nekoliko dana
60	S01XA20	hypromelosum	u oko	0,5 mg	75 mg	kod poremećaja suhog oka ili osjećaja iritacije uzrokovane nedostatkom suza u oku, lubrikantno sredstvo kod umjetnih očiju	1,5 mg	odrasli i djeca	nekoliko dana